

PROTOCOLO DE RETIRADA CATETER EPIDURAL

1.- PACIENTE EN TRATAMIENTO CON HEPARINA BAJO PESO MOLECULAR

- RETIRAR EL CATETER 12 HORAS DESPUES DE LA ÚLTIMA DOSIS.
- RENAUDAR LA SIGUIENTE DOSIS 12 HORAS DESPUES DE RETIRAR EL CATETER.
- VIGILAR si se produce algún deterioro neurológico.

2.- PACIENTE EN TRATAMIENTO CON HEPARINA SODICA INTRAVENOSA EN BOLOS O EN PERFUSION CONTINUA

- RETIRAR EL CATETER 3 HORAS DESPUES DE LA ÚLTIMA DOSIS EN BOLO O DE SUSPENDER LA PERFUSION CONTINUA.
- REANUDAR LA SIGUIENTE DOSIS DE HEPARINA 1 HORAS DESPUES DE LA RETIRADA.
- VIGILAR si se produce algún deterioro neurológico.

3.- La VIGILANCIA NEUROLOGICA consistirá en valorar horariamente durante las 8 horas siguientes a la retirada del catéter la movilidad y sensibilidad en extremidades y el dolor de espalda. En caso de aparecer alteraciones avisar a MEDICO DE GUARDIA.