

**PROTOCOLO DE SUSTITUCIÓN TEMPORAL DE DICUMARÍNICOS,
(SINTROM), PARA REALIZACION DE CIRUGÍA**

1. Suspender el **Sintrom** 3 días antes de la intervención quirúrgica prevista.
2. Desde el mismo día que se suspende el **Sintrom** administrarcada 12 horas, y por vía subcutánea **CLEXANE 60 mgr** o análogo según peso (ver equivalencias entre HBPM).
3. El día de la intervención quirúrgica se efectuará un control del **INR**, (“*International Normalized Ratio*”), que debe ser **menor de 1,5** y el **Tiempo de protrombina** debe ser >70%. Si así fuese, la cirugía puede efectuarse. Si no, se retrasará la intervención para la semana siguiente administrando **HBPM**, durante ese periodo.
4. Se reiniciará la anticoagulación con el **Sintrom** a la última dosis anterior, al día siguiente o a las 48 horas de realizada la intervención quirúrgica, (bajo indicación del cirujano), administrando CONJUNTAMENTE, HBPM a dosis anticoagulantes.
5. Suspender la **HBPM** al tercer día del post-operatorio quedando sólo con el **Sintrom** a su dosis habitual y con el control del INR por Hematología/ Medicina de Familia..

	3 días antes	2 días antes	1 día antes	Cirugía	1 día después	2 días después	3 días después
SINTROM	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI
HBPM	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI